714 - DESHERBANT SELECTIF GAZON

DESHERBANT ANTI-LISERONS*
"Désherbant anti-liserons et sélectif des gazons de graminées"

PROPRIÉTÉS

- Bon spectre d'efficacité
- Très efficace sur liseron
- Très économique

UTILISATION

Désherbant anti liserons sélectif des gazons de graminées.

CARACTERISTIQUES

Concentré soluble (SL) contenant 400 g/l acide de 2,4-D, sous forme de sel d'amine.
A.M.M. n° 8700408 (1) (1) Déposé AGRIPHAR S.A.(Intrant * DAM)
Classement Xn

MODE D'ACTION / EFFICACITÉ

Absorbé par les feuilles, **« 714 »** est véhiculé par la sève dans les plantes à détruire. **« 714 »** bloque le phénomène de photosynthèse, empêche l'absorption de l'azote et de la potasse et trouble la proportion normale des acides aminés.

« 714 » est également actif sur un grand nombre de dicotylédones concurrentes du gazon : chardon des champs, chardon lancéolé, pâquerette, grande marguerite, menthe, capselle, colchique, plantain, pissenlits, séneçon jacobée, brunelle, renoncules, bouton, d'or, bassinet, orties, petasite, porcelle.
Son action est moins sensible sur le trèfle.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

Désherbage des gazons de graminées : 2 l/HA

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

714 - DESHERBANT SELECTIF GAZON

DESHERBANT ANTI-LISERONS*
"Désherbant anti-liserons et sélectif des gazons de graminées"

MODE D'EMPLOI

1) Epoque d'utilisation :
Le traitement peut se faire dès le début du printemps, mais se fera de préférence au début de l'automne.

2) Doses d'emploi préconisées :
Pour le liseron, traiter de préférence au stade 3 feuilles. Préparer une solution à 20 % et à l'aide d'un pulvérisateur, vaporiser le liseron, en évitant de toucher les plantes avoisinantes.
2 l/ha sur gazons de graminées.
Le traitement s'effectuera sur la base de 400 à 500 litres de bouillie pour le traitement de 1 hectare, soit 40 ml de produit dans 10 litres d'eau pour 200 m^2.

3) Précautions d'emploi :
- Ne traiter que par temps calme, sans vent, sans pluie, sans forte chaleur.
- Nettoyer très soigneusement les pulvérisateurs et les rincer aussitôt après le traitement.
- S'abstenir de faire paître le bétail pendant une période de 10 jours après l'application.
- Eviter de souiller les eaux d'irrigation.
- Eviter toute pollution sur les cultures avoisinantes.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.